le S Pingré 7 S 2

Comètes

18e S

2340

suppl.
V f 4°

Cométographie du D. Dingré

1re pièce

Liste chronologique
de Comètes. (1757-1774)

1533. Dist. log. 4.32932 6 comme dans les Mem. de 1747 et non 5.5433 &c. et le pér. dans 5 signes et non dans 4. remarque de Str. 1763. p. 167

1725

1725 8b 10 10 35 15 Incl. 77 1 58 Ecr. 10 13 14 48 Dist log. 10.6 8 5731. Pas. Juin 23 6 45 22 Dir. Struyck ou plutôt Douwes. Str. a comparé 44 Observ. de Cassini. En long. 26 sous 1', 2 f. entre 2' et 3½ le reste entre 1' et 3'. latit. 26 sous 1', 16 sous 2', une de 2'32", une de 5'22" le 24 Dec. Il s'est ici glissé quelque faute p.e. d'impression dans l'obs. de Cass. la théor. de la C. est presque celle de Delisle, sauf que la C. a augmenté la dist. périhélie mal à propos de 0.2 presque, ce qui produit des 31' et plus de diff. de long. entre le calc. et l'obs. et 75' et plus en lat. 1763 p. 158 et 159.

Le MS. du fr. Gilles Phil. Transs. to. 47. p. 281.

1682 14 Sept. ☿ 26' Incl. 17 46 30 ♎ 1 20 44 Per. 10 1 49 Dist. ☽ 76 45 37 60 Bailly. Acc. sc. Hist. 1755 p. 162
21 31 17 42 0 1 20 43 10 1 36 ☽ 76 55 24 60 Halley ibid.

1757 21 Oct. ☿ 23 13 41 17 7 4 7 11 4 2 36 25 33532 ☽ 530610 Dir de Malte. sur 12 Obs. de Dir.
Astron. dont 5 des siennes. Comp. 17 au dessous de 1'. 2 entre 1 et 2'. 4 entre 2 et 3. Fde 3' 21". Acc. sc. 1763. p. 500 et suiv.

J. m. Gregory. Trs.
1757 ♎ 21 Oct. 7ʰ 55' Incl. 12 50 20. ♎ 7ʰ 4 12 50 Per. 4ʰ 2 58 6 Log. ☽ 528328 Direct. Bradley 16 Obs. du 12 7bre
à 16h 2' jusqu'au 17 8bre 17h 12' la plus grande erreur 40". Vol. 50. part. 1. p. 108 et suiv.

1757 21 Oct ☿ 56 12 48 7 4 4 4 2 49 ☽ 524875 Direct. R. Acc. sc. 1757 p. 165.
1757 21 ☿ 42 12 34 6 7 4 5 50 4 2 32 ☽ 530288 Dir. La C. ♃ de Bert. des élémens
1758 11 Juin 3 27 68 1/2 7 20 50 8 27 38 ☽ 333148 Dir. R. Acc. sc. 1759 p. 178.
1759 12 Mars 13 53 24 17 46 14 1 23 45 35 10 3 8 10 ☽ 76 30 8 48 Réf. Mayer. La Lande 1759 p. 34. Sur les
Obs. du 16 Avr. d'Arquier, Toulouse, du 1. Mai Bradl. à Londres 21 Mai La L. à Paris. Le Mess. p. 1 et suiv.
1759 12 Mars 13 57 36 17 35 20 1 23 45 21 10 3 16 20 p. 282 ☽ 76 61 1 5 Réf. Mar. ibid. p. 286. Obs. ib. 289
et suiv. 24 Obs. du 1. au 28 Mai. Compar. 23 au dessous de 1'; 18 au dessous de 2'. Mém. sur la Réf. Avr. obs. de la C. 1 et 18 mai Mar.
1759 12 Mars 13 33 17 38 1 23 48 10 3 14 ☽ 76 66 8 0 Réf. Mess. 1760 p. 425 sur ses obs.
m
12 du 21 Janv. au 14 fevr. 8 du 1 au 17 Avr. mar. 26 du 1 Mai au 3 Juin.
1759 12 13 41 0 17 37 1 23 45 10 3 16 1 ☽ 76 60 3 9 La C. 1763. p. 435. et élémens.
1759 13 10 11 31 1/2 17 28 55 1 24 7 20 1/2 10 1 0 24 ☽ 77 60 2 9 Klink. Orb. par. 1760 p. 437 et suiv.
1759 12 13 7 35 17 40 5 1 23 45 35 1/2 10 3 19 18 ☽ 76 56 50 D. Orl. ell. ibid
Obs. de la C. les siennes du 30 Avr. au 21 Mai p. 433 et suiv. fort imp. Celles de la C. 23 du 14 Avr. m. au 28 Mai 5.
Comp. avec la 1re Phde Klink. 32 moindre que 1' les autres au dessous de 2'. Avec la 2e 31 au dessous de 1'. 12 au dessous de 2'. 1 seulement
celle du 1 Mai en long.

M. Culoz à Lesde du 1 au 28 Mai. De Rotte a Montp du 7 au 30. P. Morand à Avignon Du 16 Avr. au 30 Mai. Hell a
Vienne Du 2 au 28 Mai. P. Chev. Lisbonne Du 6 au 22 Avr. et Du 28 Avr. au 21 Juin. P. Cœur de ux Pondich. 25 28 Avr.
et jours suiv. par des alignemens le 30 Avr. plus de 10° de queue. p. 456 &c. la Nux a Bourbon Du 26 Mars au 30 Mai Obs.
par haut. az. dist. de les 20. 21. 22. 25. 26. 27. 28 Avril le 21. queue 8'. le 24 25 le 1er Mai 33 à 34'. Le 5 Mai mesurée de
47°. Le 14 19. p. 460 et suiv. &c. Rouen B. et Dul. du 1. Mai au 27. Sav. Etr. to. 6. p. 383 et suiv.

1758 La Nux la observée du 30 Mai au 7 Juin. 1760 p. 463 et suiv.
1759 12 13 30 17 38 1 23 45 10 3 15 30 ☽ 76 63 64 La C. 1760 p. 53 et s. sur ses Obs.
1759 12 13 22 17 41 20 1 23 44 55 10 3 23 0 ☽ 76 51 76 Bail. Mem. Etr. to. 5. p. 16 Sur les obs
De La C. compar. p. 18 18 au dess. de 1'. 18 entre 1 et 2. 6 entre 2 et 3. 2 au dessus de 3.
Obs. de M. Chevalier ibid. p. 37 et suiv. Une Obs. de M. d'Arquier à Toulouse le 16 Avr. mar. ib. to. 6. p. 240.
1760 Comète d'Orion à Lisb. du 7 Janv. jusqu'au 22 Mem. Etr. p. 41. et suiv.
1762 Mai 28 2 1 52 3/4 85 20 10. 2 ♎ 11 18 35 23 6 3 13 42 38.5 10. 00 25 6 91 Dir. Klink. Obs. de Mcy. une de Kl.
21 Obs. du 17 Mai au 5 Juill. 15 sous 8. 8 entre 1. et 2. 5 entre 2 et 3. 3 entre 3. et 4. 9 entre 4 et 5. une 5' 0" une 7' 4" Sav. Etr. to. 5. p. 175. 176
1762 28 15 27 30 84 45 11 14 23 3 15 14 10. 00 52 89 Lal. sur les mêmes. Comp.
8 sous 9. 5 entre 1 et 2. 16 entre 2 et 3. 8 entre 4 et 5. 3 entre 6 et 10. 4 entre 10 et 25'. une de ibid. p. 92-93. et Trans. t. 52 P. II. p. 581. lettre de 30 Jul.
Klink. l'a vue le 17 Mai le 1er 16 Obs. de Mar. entre le 1 Juin et le 2 Juill. Comp. 3 sous 1. 4 sous 2. 5 sous 3. 4 sous 4. 4 sous 5. 1 sous 6. 1 sous 7. 1. 8' 7"
1762 Mai 25 0 27 48 85 22 21 11 14 55 31 3 15 22 23 10 1415 10 ♎ 00 61 03 Dir. Marald. 1762. p. 557. 56.

1783 Sept 10 16h Om

9 10 22 21.2 − 8 5 22 7.7 = 3 25 6

5 20 23 57.5 − 1 18 47.1 = 5 18 35 7.1 + 16.4 = 5 18 35 24.2

3 8 58 28 − 46 = 23

3 8 58 14 − 5 20 23 54 = 2 11 24 40

755 165 736 242 / 563 634 133 37 / 23 2 1 275 / 345 801 170

8.8 / 0.0 / 17.7 / 24.3

7.5 / 24.3 / 183.8

1 7.5 / 1 30.0 / 22.5 / 225 / 5 150

9.992795 − 11 = 9 992784

+ 1 2 1 = 1 15

Ω 5 25 2 25 Ind. 40 42 38 Per. 4 24 14 22 9 085434 / 7 268302 / 8 634151

7 Oct. 12 26 17 + 44 13 = 37 13 10 30 / 10 16 0 0 / 26 22 16 30

21 0.87500, 10 0.00634, 30 0.00035 = 88229

26.8823 1 324 458 / 88634 151 / 2.795315 / 624.187

5 : 8 18 :: 0.813 / 1 : 1 38 / 98 / 6.504 / 73 17 / 80

an. vr. 136 8 30 / ½ 68 4 15 / Per. 144 14 22 / l. in ob. 8 5 52 / 152 / Ob 175 2 25 / ar. lat. 193 3 27 / ar. Ob. 169 58 15 / l. in cl. 5 0 40 / Ind. 8 28 26 / ☿ 348 35 24 / Comm 16 25 16 / ½ 8 12 38 / Comml. 81 17 22 − 22 44 40 / Elong. 59 2 42 / l. g. 24 15

log. ind. 9 875677 / S. ar. l. 9 365347 / S. ar. v. 9 235024 / S. ind. 9 812406 / S. ar. l. 9 353572 / S. l. hel. 9 168378 / Cos. 9 555233 / 0 427756 / 0 855512 / 9 084434 / v. acc. 9 949940 / 9 555233 / D. acc. ☿ 9 505175 / 9 552784 / 0 052065 / 3 2741 / 8781682 / 0 820763 / 9 622445

S. lo. 0 548682 / S. el. 9 533270 / Pl. l. 9 173145 / S. l. g. 9 855057 / S. eb 9 451318 / S. elo. 0 068730 / D. ac. 9 540175 / D. ac ☿ 9 458227 / Cos. l. g. 0 040361 / D. a ☿ 9 498588

☽C 0.315201 / ☽S 0.583522 / CS 0.880911 / 2 179634 / 1.085832 / 0.106310 / 0.208891

☽S 0.583522 / ☽C 0.315201 / CS 0.880911 / 2 179634 / 1.085832 / 0.774631 / 0.208891

0 501412 / 0 055054 / 9 889035 / 9 315520 / 19 781381 / 9 882740 / 19 45147 / £ 55 31 31

T = 90 0 0 / C = 80 28 26 / Q = 9 31 34 / TC 0.315201

97 0 0 − 80 28 26 = 16 31 34

~~S.Q. R = TC~~ :

S.Q : S.T :: TC : CQ

0.000000 / 0.781210 / 0.501412 / 1.282622 / 1.91700

9 996751 / 1 355811 / 0 501412 / 1 853974 / 7.14457

½ 8 = 1.2

☽ 9 075181 / 0 533591 / 0 541772





1769. Combin. 1ère 1|7|61 50|21 08|13 1'6"|3 2"|1 4"|1 5"|1 7"|1 9"|1 10"|15 3'8"| 1775 p. 440.
Slop. Combine 1|26 02|12 18|4 24"|2 32"| ibid. p. 441

1759 1. 4 13 38 44 1 40 48 11 35 1 36 } 8 18222 0 65734 10 21 135 22 Dr. du 2 au 3 Ao.
I 1770 dd 4 15 28 43 1 46 31 11 26 6 40 } 7 33 030 0.62555 } 800 3 46 Dr. resp. 1re élem. 1776 p. 626 634 com
4 15 3 42 1 44 35 11 22 51 22 } 7 80 3263 0 64458 8 2 } 16 2es El. comp. p. 635
4 14 30 0 1 23 0 0 7 13 46 } 7 855 822 0 71717 25 2 8 53 3es Elem. Lemonn. 634
dd 4 15 2 8 1 42 41 11 22 56 28 } 7 80 5 743 0 65228 } 45 327 Dr. 2 a 3 Ao.
I 1770 dd 4 16 39 5 Incl. 1 44 29 Per. 11 26 7 16 Log. } 7 75 3 056 Pass. } 800 0 15' 17" Dir. R. lorsquelle paroissoit.
J'y ai ajouté une Ephém. du 15 Juill. au 1. Sept. Dec. par M. le 14 J. 1770 p. 255. et 1776 p. 632.
Obs. par M. jusqu'au 3 Oct. 1771 p. 423 M. 06 Wilder. 1786 p. 626. 637
4 12 58 0 1 46 0 11 25 25 0 } 8 125 524 0 64246 12 20 50 0 Wilder. 1786 p. 626. 637
4 16 14 1 45 20 11 26 12 50 } 7 58 457 0 63872 } 0 32 48 Slop. ibid.
4 12 0 1 45 0 11 25 57 0 } 8 00 0 294 0 631 } 3 38 0 Lambert ibid 428.
Obs. de M. 1776 p. 537 et suiv. Du 10 au 20 40' en Asc. dr. 21 pr. en Decl. obs. les 10. 16' 17 et 20 p. 424.
II 1770 Obs. par Mess. du 10 Janv. au 20 Janv. 1771 1771 p. 423 et suiv. 1776 22 Nov. 22 5 48 Petr. R. sur les obs. de M. p. 427
3 14 42 10 31 25 55 6 28 22 44 } 7 22 4 833
L'Abbé Boscowich. l'avoit vue à Milan les 10 et 11 Janv.

I 1770. 4 12 0 0 1 33 40 11 26 16 26 } 8 28 3057 0.67138 15 Ato. 13h 13h 5'.
Demi axe 3.12748606 log. 0.4780155 log. du ½ param. 0.0807300. log. excentric. 7.8552527 Lexell. p. 1776 p. 633.
Comparaison p. 540. L'excentricité devroit être 2.4734751 dont log. 0.3933082. } 8.8552527 est le log. de 0.7857965
½ par. 1.204287.
4 14 21 45 1 43 5 11 26 15 28 } 7 7 7 6 88 0.62575. Ato. 8h 15h 26'. Rittenhouse J. des Savans.

1773 Obs. de Messier du 12 Oct. 1773 au 14 Avr. 1774. 71 j. d'Obs. 1774 p. 271—327. p. 332
4 1 16 37 63 25 21 2 15 35 43 10.0545 76 1773 Sept. 5 5h 11h 14' 45" Dir. R. ib. p. 327 et Obs. 1775
Ces élémens furent donnés à l'Acad. le 22 Dec. 1773.
Dans les Obs. de Maskelyne fol. il y a 2 Obs. faites les 7 et 13 Nov.
4 3 15 62 33 2 21 40 1 238 10 0.927206 Sept. 2 12h Lambert, Mess. d'après les Ephémer
4 3 35 62 36 2 20 43 1 2155 10 0.84755 2 15 Schultz de Berlin pour 1777. p. 328.
4 1 15 37 63 25 21 2 15 35 43 10 0546 11 18 25' de la Lande selon les Tables de
Berlin. La L. l'aura sans doute envoyée sans dire qui l'avoit calculé; il aura trompé le Logar. et erré sur le T. du pass.
4 1 10 26 63 15 7 2 15 7 18 1.1287730 10.0526467 Sept. 5 5 6 Il faut l'omettre.
Excentricité. 0.7730757. Quoi. elle ne seroit pas au moins = 1. Lexell in Sll. 1777 p. 357.
4 1 12 11 63 20 57 2 15 15 50 1.1300548 10.0531145 5 5 55
Excentricité 0.7551225. Lexell élémens corrigés ibid. p. 358. temps périodique ne peut être déterminé,
parceque dans toute son apparition, la C. n'a parcouru que 67° d'anomalie vraie.
4 1 1 28 63 14 15 2 15 2 24 10.051025 5 15 4 8 mes derniers élémens

1772 Découverte à Limoges par Montaigne les 4 et 5 Mars observée par M. M. les 26 Mars, 27, 30 Mars et 3 Avr. 18 en Asc. dr. 2 en Déclin. 1777. p. 345 et suiv.
8 12 43 5 18 57 40 3 18 6 22 1.01814 fevr. 18 20 50 35. Dir. la L.
Les Obs. de Mont. du 8 au 25 Mars peu propres à constater la route de la Comète.

1771 Mem. la découvre le 1. Avr. 48 j. d'obs. jusqu'au 15 Juin. 1777. 154 et suiv.
0 27 51 0 11 15 29 3 13 28 13 0.9056 } 9.957013. Avr. 18 22 14 27 Dir. ib. 175. R.
0 27 49 37½ 11 16 44 3 13 48 21 } 9.955 1478 Avr. 15 1 42 26 merde de Stock. Dir.
Prasperin sur les obs. de M. Hargenton du 18 Avr. au 16 Mai 20 Obs. 40 Comp. une — 1 30 une 1 1 tout le reste
au dessous de 1'. p. 174. M. Harg-ne s'attendoit pas à cet accord, etant souvent peu satisfait de ses obser. p. 378
Obs. de M. de S. Jaques de Silvabelle à Mars. 63 j. d'Obs. du 22 Avr. au 17 Juill. sur loin des crep. à Mars. qui a
Par. à Par. qu'à Stockolm.) p. 180. 181 1 2 50
Avr. 15 0 37 36 mer. Pad

5785
282
6067

1774. ☉ 0 57 26 82 47 40 10 16 27 57 log. 0.153900
☉ 0 50 13 82 48 38 10 16 48 24 0 153490
☉ 0 45 83 0 10 17 22 0 155032
☉ 0 48 38 83 0 35 10 17 13 16 0 154363
☉ 0 48 39 83 0 51 10 17 19 12 0 154432
☉ 0 49 48 83 0 25 10 17 22 4 0 154906
☉ 1 22 82 21 10 17 26 0 154121

Obs. de Mess. 1775. p. 445 autres obs. en petit nombre. p. 473.

Aout 14 4 20 0 P. de S. d'après 19 et. 4 et 20 s.
14 17 56 ☉ 23 et. 11 s. 1 Oct.
15 10 55 Mechain
15 7 1 40 id. 19 et. 4 et 25 s.
15 5 53 20 ☉ 25 s. 9 o.
15 10 55 35 id. 11 s. 4 ☉ en r.
15 5 17 Bossow 19 27 et. 4 Sept. 1775. p. 473.

1775 ☉ 0 25 3 57 32 25 30 2 27 13 40 D. 0. 713 187 Janv. 4 2 24 30 etoiles.
☉ 0 25 5 51 32 24 0 2 27 13 11 0 713 127 ☽ 853 167 4 2 12 0 Mechain
☉ 0 25 3 1 32 26 14 2 27 14 0 0 713 218 4 2 30 0 Saron.

1200 16 46 48 67 15 Messier met la dist. 0. 71 4c comme logar. c'est une faute. La ☍ le 18 Janv. étoit en ♑, inférieure
400 5 35 36 67 7 8 23 sans doute. Donc 4c.
80 1 7 7
2 1 41
23 31 12

11. 25 Oct. 63 j. 25 Oct. 2 cuisses et pieds des 2e pieds d'étrecturus Grenche. 1661. ♑ 2 22 30 30 Incl. 32 35 50. Per. 3 25 58 40 ☽ 3 65 17 72 8
27 Oct.
23 22 49
1200 16 46 48
600 8 23 24
11
5 14
25 19 26
6 21 26 20 Arct. en 1800
25 19 26
5 26 6 54

0 5 55 380 105 15 T. 20 25

☉ 0 0 0	22 35 57 22 35 57	42 11 42 42 11 42	57 45 16 57 25 16	63 45 14 63 45 14	73 3 15 73 3 15
☽ 0 0 0	11 17 57 11 17 57	21 5 51 21 5 51	28 52 38 28 52 38	32 52 34 32 52 34	36 31 37 36 31 37
Per. 30 0 0	30 0 0 30 0 0	30 0 0 30 0 0	30 0 0 30 0 0	30 0 0 30 0 0	30 0 0 30 0 0
Lat. 30 0 0	87 24 1 112 35 57	47 48 18 132 11 42	32 14 41 147 45 16	20 14 41 153 45 14	10 50 45 166 3 15
☊ 60 0 0	60 0 0 60 0 0	60 0 0 60 0 0	60 0 0 60 0 0	60 0 0 60 0 0	60 0 0 60 0 0
☌ 30 0 0	7 24 1 52 35 57	347 48 18 72 11 42	332 14 41 87 45 16	320 14 41 93 45 14	310 56 45 109 3 15

Cas. in.	☽☽ 25 55 45	☽☽ 25 55 45	☽☽ 25 55 45	☽☽ 25 55 45	☽☽ 25 55 45
S. ar. le.	☽ 3 68 14 35	☽ 1 13 55 0	☽ 1 16 58 5	☽ 3 24 68 7	☽ 2 72 11 71
Sat. re.	☽ 6 86 58 4	☽ 0 35 39 5	0 0 42 13 0	☽ 2 60 23 2	0 41 88 32
S. in.	☽ 7 31 40 4	☽ 7 31 40 4	☽ 7 31 40 4	☽ 7 31 40 4	☽ 7 31 40 4
S. ar. le.	☽ 6 38 37 0	☽ 10 95 17	☽ 5 00 01 8	☽ 3 22 17 75	☽ 5 78 68 4
S. lat. hel.	☽ 4 20 37 4	8 8 1 32 1	☽ 6 31 45 0	☽ 5 05 61 7	☽ 7 10 08 8

☉

6

2e pièce

Observations sur la Comète... (?)

autres sur le même objet
(par M. Cassini de
Thury.)

S. d.

Observations de la comete



ces observations ont été faites avec une lunette de 3 pieds $\frac{1}{2}$ à laquelle est adapté un reticule romboïde dont AB est egala 1° 14' 21" ainsi qu'il resulte des observations des 11 et du 12, ayant trouvé que l'étoille n des poissons employoit 5' 7" $\frac{1}{4}$ à parcourir AB en prenant un milieu entre plusieurs resultats. ~~la lunette avoit 3 pieds de longueur~~

la pendule reglée sur le moyen mouvement avançoit à g.d sur cet de 1' 8" sur le temps vrai et retardoit de 16" dans 24 heures

le 11

temps a la pendule				temps vrai du passage de la comete par le fil horaire		
I						
7 h	22'	4 $\frac{1}{2}$	etoille n des poissons a l'angle A des obliques suivant le fil ~~AB~~			
	26	52	la comete paroit a l'oblique meridional	7 h 27' 34"	20 47 41,	13 47 25
	27	10	etoille n disparoit			
	27	42	2e etoille a l'oblique meridional			
	30	6	2e etoille disparoit			
	30	32	comete disparoit			

2

7	36	55	etoille n. a l'angle des obliques suivant le fil			
@	39	27	etoille n a l'horaire			
	41	46	la comete a l'oblique meridional	7 42 29	20 48 45	13 47 21
	42	2	etoille n disparoit			
	42	34 $\frac{1}{2}$	2e etoille a l'oblique meridional			
	45	0	2e etoille disparoit			
	45	27 $\frac{1}{2}$	comete disparoit			

temps a la pendule				temps vrai du passage de la comete a l'horaire	ascension droite de la comete	declinaison Geocale de la comete
III obser.						
7 h	48′	20	etoille n. a langle			
	53	13	comete a l'oblique meridional			
	53	26 ½	etoille n. disparoit			
	53	58 ½	2e etoille a l'oblique meridional	7 53 54	20 48 53	13 47 35
	56	23 ½	2e etoille disparoit			
	56	51	comete disparoit			
IV obser						
8	6	21 ½	etoille n a langle			
	6	38 ½	etoille n au milieu			
	11	17 ½	comete a l'oblique meridional			
	11	29	etoille n disparoit	8 11 58	20 49 26	13 46 10
	11	59	2e etoille a l'oblique meridional			
	14	24 ½	2e etoille disparoit			
	14	55	comete disparoit			

j'ay supposé l'ascension droite de l'etoille n de 19d 46′ 31″ et sa declinaison de 14d 6′ 11″ telle qu'on la trouve dans Flamsted pour 1766

12

la pendule avançoit a 6 h ½ du soir de 2′ 35″ sur le temps vrai ayant transporté dans un autre endroit de l'observatoire et retardoit de 16″ dans 24 heures.

1ere obs.

7 h	5	35	etoille n. a langle suivant le fil
	6	10	etoille n au milieu
	10	41	etoille n disparoit

† car mes observations ont
a la difference en ascendroite 1 4 52
Flamsted ——— 1 3 30
en declinaison
par moy ——— 39 7
Flamsted ——— 40 0

temps de la pendule				temps vrai du passage de la comete a l'horaire	ascension droite de la comete	declinaison de la comete
7	11	17 1/2	2e etoille a l'oblique meridional	7h 13' 20	21 43 35	13 23 23
	13	39	2e etoille disparoit			
	14	52	la comete a l'oblique merid			
	16	59	la comete disparoit			
	11	065.				
7	36	22	letoille n a l'oblique boreal			
	37	59	etoille n a l'horaire			
	39	36 1/2	la belle etoille disparoit			
	40	12	2e etoille a l'oblique meridional	7 43 15	21 44 24	13 23 17
	43	54	la comete a l'oblique meridional			
	44	23 1/2	2e etoille disparoit			
	46	3	comete a l'horaire douteux			
	47	47	comete disparoit			

14 1111

je comparai la comete le 14 et le 15 a letoille que javois observé le 11 et le 12, suivant les observations du 11 son ascension droite est de 20 51 27 et sa declinaison de 13 26 4 et par les observations du 12, son ascension droite est de 20 51 19 et sa declinaison de 13 26 15,

je supposerai faisant son ascension droite de 20 51 23 et sa declinaison de 13 26 9 en prenant un milieu entre les resultats du 11 et du 12. il paroit que cette etoille est la 96me de Flamsteed dont lascension droite est de 20h 50' 4" et la declinaison de 13 26 57 pour lannée 1766 il est clair que ce sont ces deux etoilles (n et la 96me) +

temps a la pendule			temps vrai du passage de la comete a l'horaire	ascension droite de la comete	declinaison de la comete
7 h	34	21 ½	letoille a loblique boreal		
	35	31	letoille a l'horaire	2 16	7 35 29
	36	37	letoille disparoit		23 26 22
	43	46	la comete a loblique meridional		7 43 56 23 27 38
	45	49	comete a l'horaire dout	4 13	2 15 ½
	47	59	comete disparoit		4 13

12 38 34
12 37 43
30 5
3 45
33 50 7 9 3 0 6
0 33 0 9 2 8 9 4 4
1 0 10 7 9 8 2 5 0
3 15
1 3 25 8 2 6 6 0 0
9 2 8 9 4 4
1 1 55 8 2 5 5 4 4

15

la pendule avancoit de 1' 37" sur le temps vrai a 6 h ½ du soir
et de ~~17"~~ dans retardoit de 17" dans 24 heures

7	54	34 ½	letoille a loblique boreal			
	55	34	a l'horaire			
	56	36 ½	letoille disparoit			12 10 41
	~~57~~	~~16~~ ½		6 7 27	24 14 4	~~12 16 17~~
6	7	36	la comete a l'oblique meridio			
	9	2	a l'horaire			
	10	30	la comete disparoit.			

observations de mr
cassini de thury avec la meme
pendule et la meme lunette

le 12

temps a la pendule		
7	18	22 1/2 etoille n. a langle
	20	59 qu l'horaire
	23	31 etoille n disparoit a langle
	24	4 2e etoille a l'obliquo meridional
	25	15 1/2 2e etoille a l'horaire
	26	26 1/2 2e etoille disparoit
	27	40 1/2 comete a l'obliquo meridio
	28	46 comete a l'horaire
	29	46 1/2 comete disparoit

BIBLIOTHEQUE DE SAINTE GENEVIEVE

le 13

7	33	17 etoille du 12 a l'obliquo boreal
	34	47 disparoit
	43	7 comete a l'obliquo meridional
	45	17 comete a l'horaire
	47	28 comete disparoit

~~au moyen~~

14

7	57	41 1/2 etoille n. a l'obliquo boreal
	59	54 etoille disparoit
8	6	52 comete a l'obliquo meridional
	9	11 comete a l'horaire
	11	24 comete disparoit

23 26 45 12 37 37
32 18 58

3e pièce

Cométographie du d. Lingré

Note du d. Lingré sur
différents auteurs à consulter.

N. B. Les cahiers astronomiques y ont été ajoutés par le d. Lingré. La difficulté est de savoir où qui les rapporter.

12

Il faut voir la Comete de 602 ou 605 dans Blaine, s'il la rapporte au Consulat de Sabinien. Oui

Il faut consulter Usinorn sur la Comete de 837.

Item s'il fait paroître la Comete de 841 ou 42 dans le Cartulaire.

Il en parle l. 5. c. 17 presque en mêmes termes que l'anonyme Astronome le même chapitre, il fait paroître dans le mois de Janvier de cette année une Comete et ajoute que Pepin alla mourir peu après. Il trouve le 13 Dec. 838 Clem.

Voir si M. Boethe met une Comete en 874.

Kennett. il parle d'une Comete qui fut observée pour 37 jours dans l'automne, l'autre suivit le 8 mois après. Il marque que les Actes furent envoyés à Rome par Boethius. Ingena Annal. 4 Mai. Menium eam Asserius lunam praecedens

Chercher Cirinus pour 905

Voir si dans Luitprand la Comete de 939 sept suivie de peste, de famine et de guerre

Oderic. Chron. Sidegar. Sigibert. Chron. Malleac. in Bouq. Urspergens. Chron. Ursperg. Chron. Sigeb. Chron. Malleac.

Sur 942 Verifier ce qui regarde la partie orientale et occidentale, pour faire la note

Voir si Chron. S. Florentii rapporte la Comete en 941 ou 942.

Voir si Vosperg en 945 dit que la Comete parut en Italie durant 8 jours. In Italia portendens famem

Voir si Chron. Salmur. met la Comete de 892 en 992.

Voir si en 1031 ou 1032 il y a eu une Ecl. de ☽ 10 four. 1031 à 6h m. totale

Verifier la Date d'Arentin vers 1068 p. 136 de mon recueil.

Voir sur ~~1111~~ (1200) si Snellius confond deux Haly.

Chercher Balle sur la Com. de 1239.

Anno 1239 fridericus Caesar a Papa Gregorio nono excommunicatus. Apparuit hoc anno * draco luciferi * maxima in fronte habens cornua, et jaculabatur per totum aerem, quasi fugitivus ardentes igneos et fumum. Ut Matthieu Paris.

1789 6 12 15 28 — 3 9 8 9
1800 0 16 40 24 — 1 0 20 0
An. Chr. 11. 6 28 55 52 — 2 8 48 9 ½
7 febr. 1 7 27 10 — 6
28 48 15
Atm. 8 6 23 2
2 8 48 15
L.m. 10 15 11 17
+ 1 47 24
10 16 58 45 10 34

1789 14 3 4 39 — Ar. m. Sol. — Arg. an. — Dist. du ☉ au ☽
1800 19 0 47 36 — 6 26 50 23 — 11 5 15 6 34 — 2 1 27 21.
11 Dec. 26 17 17 3 — 0 2 7 30 — 7 14 57 40 — 9 18 50 46
2 mai/febr. 29 0 24 33 — 6 24 42 47 — 4 0 8 54 — 4 12 36 35
23 18 45 9 — 1 28 12 34 — 1 21 38 1 — 2 1 20 28
+ 5 9 4 — Ar. m. pl. — 4 19
23 23 54 13 — 8 22 55 26 — 5 21 46 55 — 6 13 57 3 — 23
+ 7 45 — 5 23 29 45 — 5 21 27 1 — 1 58 20
24 7 39 — 3 1 28 25 — 6 14 6 30 — 4 18
4e Eq. arg. — + 1 55 44 — + 1 55 44 — 2 11
5 23 22 45 — 6 16 2 14

Ar. Ch. 11 6 28 55 52
5 febr. 1 5 24 54
8 4 24 46
2 8 48 15
10 13 13 1
+ 1 45 52
10 14 58 53

Entr. En 15° ♎ à Pekin
Le 5 febr. vers 6h

720 ans 10 d
1440 20
1 20
40
1620 ans 20 d 30'
15 50
20 45 50

Eq. — 11 45 + 2 25
0 25
— 31 30
— 43 40
+ 2 25
— 41 15 somme 9' 5h 2° 32' 23"
+ 1 55 44 Eq. Duo 4" 1 32
2 36 59 Diff 2

1760 15 Eto. 12h en 23d 36' ♎
4 Eto.

16h 6 2 49 — 3 7 29 — 2 1 58
-760 11 23 31 — 11 48 1000 5 7
6 26 20 — 2 25 42 — 3 3 38
6 9 18 — 6 9 18 — 5 10 43
107 hr 7 28 31 — 8 19 12
2 07 49 — 2 28 31
2 25 42 — 2 25 42
1 — 5 24 13

224 j 16h 48' 1/3
24
896
448
5376
16
6
5392h 48'
323568 1/3
970705
1760
193
1567

360d :: 365j 6h
22
1460
7306
8766h
525960'
1577880
366
9467280
47336 40
568036800 | 970705
5682 8430 — 585° 10' 46" 41''' 41''''
50 27900 — 360
1 74375 — 225
10 46 2500 — 7s 15°
75 5450
45327000 — 585 10 46 41
6498800 — 146 17 42
674570 — 46 46
40474200
1646000
67 52 95

1 7s 15° 10' 46" 41''' 41''''
2 3 0 21 33 23 22
3 10 15 32 20 5 3
4 6 0 43 6 46 44
5 1 15 53 53 28 25
10 3 1 47 46 56 50
20 6 3 35 33 53 40
30 9 5 23 20 50 30
40 0 7 11 7 47 20
50 3 8 58 54 44 10
100 6 17 57 49 28 20
200 1 5 55 38 56 40
300 7 23 53 28 25 0
400 2 11 51 17 53 20
500 8 29 49 7 21 40
1000 5 29 38 14 43 20

1000 5 29 38 15
500 8 29 49 7
60 6 10 46 42
7 4 16 15 27
3m 4 26 17 42
6 22 47 13

4 23 30
6 22 47
193 4 Mai 10 0 43
6 22 47
4 23 30
10 0 43
4 26 14
193 4 Ct 2 27 1
200 1 5 50
393 4 2 57
— 4 6 0 43
389 4 Ct. 10 2 14
393 7 16 37
4 Eto. 5 18 51
6 22 47
4 Mai 10 26 4





4e pièce

Théorie des Comètes
du 3e degré.

Problème

Etant observées une longit. et une latit. d'une Comète qu'on suppose être le retour d'une Comete connue, s'en assurer par le calcul. S. soleil. ☊. ligne des ☊ Comete. c sur l'ecliptique. ☊. Perih.

Dans ☊☉☽ on connoit ☊☉. ☉☽ et ☊. Calculez ☊☽ = $\frac{\sin ☉☽ \cdot ☊☉}{\sin ☊☽}$

☊☽ = ☊☉ ± ☉☽

Dans c☽☊ on a c☊ = c☽ sin. c☽☊.

Dans c☊C on a Cc = c☊ tang. Coc = c☽ sin. c☽☊ tang. Coc.

Dans C☽c on a Cc = (☉☽ − c☽) tang. C☉c.

Donc égalant ces 2 valeurs de Cc on aura

c☽ sin. c☽☊ tang. Coc = ☉☽ tang C☉c − c☽ tang. C☉c

Donc c☽ sin. c☽☊ tang. Coc + c☽ tang. C☉c = ☉☽ tang. C☉c.

Donc c☽ = $\frac{☉☽ \text{ tang. } C☉c}{\text{s. } c☽☊ \text{ tang. Coc} + \text{tang. } C☉c} = \frac{☉☽ \text{ tang. lat. geoc.}}{\text{s. } c☽☊ \text{ tang. incl.} + \text{tang lat. g.}}$

☽C = ☉☽ − c☽. ou = $\frac{☉☽ \sin ☉☊☽ \text{ tang. C☽c}}{\sin ☉☊☽ \text{ tang. C☽c} + \text{tang. C☉c}} = \frac{☉☽ \sin ☉☊☽ \text{ tang. incl.}}{\sin ☉☊☽ \text{ tang. incl.} + \text{tang lat. g.}}$

Dans S☉C. on connoit S☉. ☉C et ☉. on calculera S.

S☉ + ☉C : S☉ − ☉C :: tang. $\frac{180 - ☉}{2}$: tang. $\frac{S - C}{2}$

C☽ ± ☽S = C☉ c☉☽ arg. lat. réd.

Dites Cos. incl : R :: tang. c☉☽ : tang. C☉☽.

On connoit C☽P. Diff. entre le dœt le périh.

Donc C☉P (anom. vr.) = C☉☽ + ☽☉P. Cherchez le temps qui y répond et connoissant le temps du passage au Périhélie calculez le lieu C. s'il ne convient pas avec le lieu observé, la c n'est pas la même.



Sin ☊☽ : S☉ :: Sin ☉☊☽ : ☉☽

1682 ☊ 1° 20 48 Incl. 17 42 Pér. 10 1 36 ☉ 7 6 5 2 6 Rect.
☊ 1 23 30
10 2 30

13 23 30
10 2 30
3 21 0

A.m. 3 21 2 ☽
÷ 2

1757 ☉ Sept 4h 50 Long. 100 15 Lat. 10 10 B.
Long. 104 7 Lat. ☽ 3 38 Bor. ☉ 17 4 18 10 Dist log. 1 0 0 1 5 0 0

5 24 18 10

☉ 7 6 5 2 6
☽ 4 8 2 6 8
5 6 7 3 4 4



ne peut aller [illegible]



☊ Rect. 13 23 30
☉ P. 10 2 30
P. ☊. 3 21 0
☉ 7 23 30
Rect. 10 2 30
☉ Pri 2 0 0
0.21647
0.73744
A.m. 11 0 0 ☽ 0 7 6 5 2 6
÷ 2 5 5 3 0 3 4 3 0 0 2 5 7 0 1 0 1 8 1 6
☊ 1.82
☽ 0.86 0 0 4 4 0 0 6
0 1 6 8 0 1 2
7 6 5 2 6
0.8 5 7 6 5 4 9 3 3 3 0 8

$ED = \sqrt{\frac{3}{4}}$ $EH = 2\sqrt{\frac{3}{4}} = \sqrt{3}$ $HI = 2 - \sqrt{3}$

$DL = \frac{1}{2}\sqrt{3}$

Soit $BDC = 120$ Donc $LM = \frac{1}{4}\sqrt{3}$ $DG = \sqrt{3}$

~~$CM^2 = BC^2$ ou $DL^2 + LM^2 = \frac{3}{4} + \frac{3}{16} = \frac{15}{16}$ Donc $CM = \frac{1}{4}\sqrt{15}$~~

$CM^2 = DC^2 - DM^2 = \frac{3}{4} - \frac{3}{16} = \frac{3}{16}$ Donc $CM = \frac{3}{4}$

$CE = 1 : LM = \frac{1}{4}\sqrt{3} :: HI = 2 - \sqrt{3} : GK = \frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{3}{4}$ $DK \frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{4}$

$KD = \frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{4}$ 0 2084481
$BD = BL \frac{1}{2}\sqrt{3}$ 5 5375306
0 2705175
16 48 47½
5 1802501
0 2385866
5 7188107

BDL 60°
½ 30
Compl. 60
2 37 35
KBD 87 37 35
DKB 32 22 25

$\sqrt{3}$ 0.4771213
$\sqrt{3}$ 0.2385866
½ 0.3010300
5 5375306
0.8660255
0.7500000
1 1660255
0.2084481

$\frac{1}{4}\sqrt{3}$ ½$\sqrt{3}$
$2 - \sqrt{3}$ $+\frac{3}{4}$
$\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{3}{4}$

Sin. DKB : BD :: Sin KDB : KB

DKB 32 22 25
½ 16 11 12-
Compl. 73 48 47-
— 53 42 33-
HDK 20 6 14
Devroit être 20 0 0

5 5375306 S. KDB
5 5375306 BD
0 2712509 S. DKB
0 1463521 BK.
0 3010300 2
5 8453221 ½BK = BH
0 2084481 DK
0 3631260
21 34 8
5 5562262
0 5371871
0 1341133



$CP : R :: ST : \frac{\cos I}{\sin S} + \frac{\sin I \sin I}{\sin S \tan I}$

$ST = \frac{CP \cos I + CP \sin I \sin I}{\sin S \tan I}$

$ST \sin S = CR \cos I + \frac{CP \sin I \sin I}{\tan I}$

$ST \sin S \tan g\, I = CP \cos I \tan g\, I + CP \sin N \sin I$

$ST \sin S \tan g\, I$
$\cos I \tan g\, I + \sin I \sin N$



$$f = \frac{ab}{a + b\cos u - a\cos u}$$

$$af - af\cos u + bf\cos u = ab$$

$$af\cos u + ab - af = bf\cos u$$

$$a = \frac{bf\cos u}{b - f + f\cos u}.$$

$$\frac{b-f}{f\tan\Phi} - \frac{b+g}{g\sin\Phi} = \frac{b-f}{f\tan\Psi} - \frac{b+h}{h\sin\Psi}$$

$$b - f - \frac{(b+g)f\tan\Phi}{g\sin\Phi} = \frac{bf\tan\Phi - ff\tan\Phi}{f\tan\Psi} - \frac{bf\tan\Phi + hf\tan\Phi}{h\sin\Psi}$$

$$bg\sin\Phi - fg\sin\Phi - bf\tan\Phi + gf\tan\Phi = \frac{bfg\sin\Phi\tan\Phi - ffg\sin\Phi\tan\Phi}{f\tan\Psi} - \frac{bfg\sin\Phi\cos\Phi + fgh\sin\Phi\cos\Phi}{h\sin\Psi}$$

$$bfg\sin\Phi\tan\Psi - ffg\sin\Phi\tan\Psi - bff\tan\Phi\tan\Psi - gff\tan\Phi\tan\Psi = bfg\sin\Phi\tan\Phi - fgf\sin\Phi\tan\Phi - \frac{bfg\sin\Phi\cos\Phi\tan\Psi + fgh\sin\Phi\cos\Phi\tan\Psi}{h\sin\Psi}$$

$$bfgh\sin\Phi\tan\Psi\sin\Psi - ffgh\sin\Phi\sin\Psi\tan\Psi - bffh\tan\Phi\sin\Phi\tan\Psi - ffgh\tan\Phi\sin\Psi\tan\Psi = bfgh\sin\Phi\sin\Psi\tan\Phi - fgh\sin\Phi\tan\Phi\sin\Psi - bfg\sin\Phi\tan\Phi\tan\Psi - ffgh\sin\Phi\tan\Phi$$

$$bfgh\sin\Phi\tan\Psi\sin\Psi - bffgh\sin\Phi\sin\Psi\tan\Psi - bffh\tan\Phi\sin\Phi\tan\Psi - bffgh\tan\Phi\sin\Psi\tan\Psi = ffgh\sin\Phi\sin\Psi\tan\Psi + ffgh\tan\Phi\sin\Psi\tan\Psi - fgh\sin\Phi\tan\Phi\sin\Psi - ffgh\sin\Phi\tan\Phi\tan\Psi$$

$$bgh\sin\Phi\tan\Psi\sin\Psi - bgh\sin\Phi\tan\Phi\sin\Psi - bffh\tan\Phi\sin\Psi\tan\Psi + bfg\sin\Phi\tan\Phi\tan\Psi = fgh\sin\Psi\tan\Psi + fgh\tan\Phi\sin\Psi\tan\Psi - fgh\tan\Phi\sin\Psi - fgh\tan\Phi\tan\Psi$$

$$bgh\sin\Phi\tan\Psi - bgh\sin\Phi\tan\Phi\sin\Psi - bffh\tan\Phi\sin\Psi\tan\Psi + bfg\sin\Phi\tan\Phi\tan\Psi = fgh\sin\Phi\sin\Psi\tan\Psi + fgh\tan\Phi\sin\Psi\tan\Psi - fgh\sin\Phi\tan\Phi\sin\Psi - fgh\sin\Phi\tan\Phi\tan\Psi$$

$$bgh\sin\Phi\tan\Psi\sin

17

5e pièce

Cométographie de

L. Lingre

Calculs sur l'apparition

de la Comète de ... (?)

1re observation 6 février
2e observation 11 février
3e Observation 24 Février
4e observation 1 Mars

Log. Dist ☉ ♄
Lieu du Soleil
Lieu de la ☿
Lieu de la Comete geoc.
Parallaxe geoc. de Com. ☉
de la Comete
Inclin. de la Com.
☉♄
☉☿
☉♄ ±
s. ☉♄ = b
½ ☉☿ = c
½ ♄☿ = d
☉ = a

Loc. ∝ in Ecl.
Cor. Incl.
Cot. ♄☿
Cot ☉♄

Loc. ∝ in ♉.

Incl. ♄☿

avant 1J 20h.03



☉♄=SC
☉C=SK
♄☉C=CSK

SCK=☉♄C
CKS=☉C♄

Somme
½ Dp.

Db 11 22 30 Incl. 30°

3 39340
0 57735
3 97075

0 54453
ac 0 19224
x.Dq 3 59271
0 33559
3 94793
Dq 3 47623

0 75202
0 00187
0 75015

Ds 3 87515
Cq 3 54371
Sdq 3 71756
Corin. 3 93753
Cor.CSq 0 21997

31 4
5 22 30
4 21 26

Dq 3 59271
0 06247
Cq 3 65518
S.CSq. 3 71264
CS 3 94250
b 0 87599
a 0 41790
0 12409
18 44855
3 22427-
3 93312
3 15734
6 70486
2 45253
282.49

0 87599
1 69540
0 56527
0 29206
0 85527

272.6
pr 120

Db 11 22 30 Incl. 15°

3 39340
0 28795
3 68135

0 56435
0 19224
Dq 3 62787
0 33559
3 94793
Dq 3 31141
Ds 3 10367
Dq 3 02749
Sdq 3 71753
Corin. 3 98494
Cor.CSq 0 26741

9 81547
8 00147
0 41350

28 25
5 22 30
4 24 5

Dq 3 62784
Sdq 0 01506
Cq 3 64295
S.Cq 3 67750
Cs 3 90545
b 0 92353
a 0 90642
0 01701
18 23070
3 12535
3 60099
3 07544
6 70486
2 37058
651.8
2 37058
234.74

0 92353
0 81304
0 60435
0 30784
0 91289

272.6
88.4
184.2
46.0
134 4

88.4
pr 120
204.5

1 Supp. pr 120

Db. L 11 22 30
Incl. I 15 0
int. 1 on 2. T 88.4
int. 1 on 3 A 1179.1

g + 300
e + 900
p + 184.2
q + 185.1
k + 31.6
n − 661.9
m − 643.7
h − 747

0 29058
0 57735
1 86833

0 27145
3 69046
3 41901
0 00373
3 11570
8 53844

0 03455
8 86574
0 90029

3 95438
3 41901
3 46483
3 93753
0 47290

18 36
5 22 30
5 3 54

3 41901
0 06247
3 48148
3 50374
3 97774
0 95004
0 56527
0 31684
0 84195
0 44790
0 10214
19 00920
3 50460
8 94544
3 45004
6 70486
2 74518
556.13

233.7
pr 432

2 Supp.

L 11 22 30
I+e 30 0
T+p 272.6
A+n 517.2

x = (nk − ph : g) / (nq − pm)

n − 661
k + 31.6
397.2
661
1980

p + 184.2
h − 747
1288
736
1288

nk − 209192
− ph − 137448
nk − ph + 116529
g + 300
+ 349587 00 / 43776
· 178

1 29058
0 57735
1 86833

0 19283
3 69046
3 49763
0 00373
3 11570
8 61706

0 04141
0 46574
0 90715

3 95768
3 49763
3 53995
3 98494
0 44509

19 44
5 22 30
5 2 46

3 49763
0 01506
3 51265
3 52846

3 98423
0 96434

0 96434
0 60435
0 32145
0 92580

0 52353
0 13054
0 81304
0 60435
0 30784
0 91289

527.3
233.7
292.6
73.1
3 0088
454.2

527.3
pr 432

3 Supp.

L+g 11 27 30
I 15 0
T+q 273.5
A+m 535.4

n − 662
q + 185.1
662
3310
5290
6620

p + 144.2
m − 643.7
118.94
552 87
7308
11052

nq − 122530
pm − 118553 54
− 3976

nq − pm = − 3576

3 82593
3 85342
8 68345
0 85207
3 66421
7 77937

0 00602-
1 03440
1 04042-

0 01721
8 06349
8 04628
3 93753
1 89125

0 44
5 22 30
5 21 26

8 06349
0 06247
8 12596
8 10871
0 01725

1·04052

1 04052
0 84790
0 19262
10 28470
3 64235
3 96005
3 80240
6 70486
2 89754
789.83
272 6
517 2

0 56527
0 34644
0 91211

0 07863
0 57735
0 65598

3 56417
3 89342
8 32925
0 05207
3 66341
8 04573

0 01111
1 03440
1 04551

0 01933
8 32325
8 30392
3 98494
1 67502

1 13
5 22 30
5 21 37

8 32325
0 01506
8 34431
8 32488
0 01943

1·21532
1 04574

1 04574
0 90642
0 13932
0 05782
18 76208
3 88104
3 66423
3 34756
6 70486
2 64270
740.2
2 64270
439.24

0 60435
0 32145
0 92580

3 32994
3 74360-
3 58634
3 80782
6 70486
3 10296
1267.5
88.4
1179.1

3 14370
3 57185
2 57306
3 55091
6 70486
2 84605
701.54

362.3
pr 432

CAB.SC. 3 94250
CAC.SK — — —
BAC.CSK 36 20
149 40
74 50
17 34
CABC.SCK 92 24
CACB SKC 57 10
3 71749
CR 3 21525
0 56692
3 50066
S SKC 0 07510
SC 3 94250
S.KSC 3 71332
0 25441
BC.CK 3 73092
CR 3 21825
S CB2 3 49533
CBC 14 14
CAC 92 24
CABR 110 38
CBBt 20 38
4 21 26
Ref 4 0 48
CAC1 64 22
Jonsm 3 77121
CAC2 3 94250
CA1 3 91371
CAB

D.Ref. 3 92434

0 87549
1 04052
1 91551
0 16453

0 41940
0 87599
1 69579
0 83743-

CAB.SC 3 56545
CAC.SK
BAC.CSK 27 21
152 36
76 18
31 20
CABC.SCK 107 38
CACB SKC 44 54
3 66377
CR 3 50757
0 01301 CR
3 78435

S SKC 3 15077
SC 3 90545
S KSS 3 66255
BC.CK 3 77317
CR 3 50757
S.CSR 3 72840
CBR 32 21
CABC 107 38
CABR 139 59
CABBt 43 59
4 24 5 Ref.
Ref. 3 4 6
CAC1 40 1
Jonsm 3 80422
CAB 3 90545
CA1 3 77367
CAB

D.Ref. 3 88006

0 92353
1 24532
2 16885
0 32179
27 12
152 48
76 24
14 23
3 70570
3 08711
0 61632
3 40913
0 05400
3 35545
3 60001
3 07746
3 08711
3 40785
14 49
90 47
105 36
15 36
4 24 5
4 8 29
74 24
3 28370
3 90545
3 34915

0 92353
1 04574
1 96927
0 12221

0 88951
0 52353
Ref. 1 81304
Ref. 0 90652
0 23534
3 80634
1 51737
0 75868-
3 95738

14
24
72
301
432

10 44
3 24 5
2632
6020
3 10 46

Vera hypot.

L + x
I + y
T+K 120.0
A+h 432

Incl. 14 45
Db 11 22 30
Ref. 3 10 46

Ind. 1430









20

Le quel

Le d. Fingré

Calculs astronomiques.

paginés de 1 à 11.

1



VIII. Hyp. — VIII. hyp. par les Δ



Il y aura encore moins que par la précédente.

23

25 Oct.

XI Hyp. 1763 Meth. ordin. XII Hyp.



8 XIII hyp.



R. tang ☌-P :: Cos I : Tang ☌-P sur l'Ecl.

XIV hyp.

XV hyp.

XVI hyp.

XVII hyp.





XXI hyp. 0 07148640

XXII Hyp. 0 07445530

25


Usus Tabulæ lapsûs Parabolici